

Клещ

- основной переносчик клещевого энцефалита и болезни Лайма.



Клещевой энцефалит - острая природно-очаговая трансмиссивная вирусная инфекция с преимущественным поражением нервной системы, передающееся через укусы клещей и сырое (чаще козье) молоко зараженных животных.

- это бактериальное заболевание, с преимущественным поражением кожи, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, склонное к хронизации.

Болезнь Лайма

поражением кожи, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, склонное к хронизации.



Меры предосторожности:

Одежда. Надевать одежду, максимально закрывающую тело желательно светлую. Обязательно надевайте головной убор.

Средства от клещей. Предварительно обработать одежду (не на себе) отпугивающими средствами от клещей – репеллентами, которые можно приобрести в аптеках или в магазинах.

Поведение Во время прогулки старайтесь идти по середине тропинки.

Привалы на природе устраивайте вдали от деревьев и кустарников.

Каждый час пребывания в лесу проводите само и взаимосомотры.

В целях безопасности не приносите букеты из полевых или лесных цветов в дом.

Снятых с одежды клещей не следует раздавливать или выбрасывать.

Козье молоко пейте только после кипячения.

Приусадебные и дачные участки. Регулярно скашивайте траву, удаляйте сухостой, не допускайте свалок бытового мусора на личных дачных участках, ведите борьбу с грызунами.



Нужно знать!

Клещи могут нападать не только в лесу, но и в скверах, парках, на дачных и

приусадебных участках. Специалисты ГУ «Каменецкий рай ЦГЭ» по Вашей заявке проведут обработку территории от клещей. Справки по телефону:

2-29-04

Исследования клещей проводятся на платной основе. Бесплатные исследования клещей проводятся по направлению организаций здравоохранения лицам, имеющим медицинское противопоказание к приёму лекарственных средств, предназначенных для профилактики клещевых инфекций.

Детям, получившим укус клеща во время нахождения в оздоровительном лагере.



Алгоритм действий при укусе клеща:

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в ближайшую организацию здравоохранения. При отсутствии такой возможности клеща извлечь самим с помощью петли из хлопчатобумажной нити или пинцета. Место присасывания обработать антисептиком.

!!!Обязательно обратиться к врачу-инфекционисту или участковому терапевту (педиатру), для назначения профилактического лечения и установления медицинского наблюдения.



Снятого клеща можно исследовать на наличие возбудителя клещевого

боррелиоза и наличие вируса клещевого энцефалита по адресу : г. Брест, пл. Свободы, 11 "а", 3 этаж, кабинет №3