



СТОП
КОВИД
БЕЛ



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ основной (первичной) и бустерной ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ COVID-19

ОСНОВНАЯ (ПЕРВИЧНАЯ) ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19 – курс вакцинации в соответствии с инструкцией к иммунобиологическому лекарственному препарату (далее – ИЛП), проводимый пациенту впервые.

Для проведения вакцинации против COVID-19 используются следующие ИЛП:

- ▶ лекарственный препарат Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (далее – Гам-КОВИД-Вак);
- ▶ лекарственный препарат СПУТНИК ЛАЙТ Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (далее – СПУТНИК ЛАЙТ);
- ▶ лекарственный препарат COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (далее – SINOPHARM);
- ▶ иной ИЛП, применяемый в (вне) пределов Республики Беларусь.

Основная (первичная) вакцинация **для лиц 5-17 лет** может состоять из двух доз SINOPHARM или иного ИЛП. **Для лиц 18 лет и старше** может состоять из одной (СПУТНИК ЛАЙТ, иной ИЛП) или двух доз (Гам-КОВИД-Вак, SINOPHARM, КовиВак, иной ИЛП) вакцины.

БУСТЕРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19 – курс вакцинации, включающий введение одной дозы вакцины, проводимый пациенту **через 6 и более месяцев** после законченной основной (первичной) вакцинации и (или) ранее проведенной бустерной вакцинации.

Для бустерной вакцинации используются вакцины СПУТНИК ЛАЙТ, Гам-КОВИД-Вак (1 или 2 компонент вне зависимости от ранее использованной вакцины на основную (первичную) или бустерную вакцинацию).

В период беременности и грудного вскармливания, а также **лицам, имеющим противопоказания к введению СПУТНИК ЛАЙТ или Гам-КОВИД-Вак**, бустерная вакцинация проводится с использованием вакцины SINOPHARM.

Бустерная вакцинация может быть сделана после выздоровления пациента, в том числе после перенесенной инфекции COVID-19, и (или) завершения изоляции (в случае необходимости).

Допускается совместное применение вакцины против COVID-19 и вакцины против гриппа (за исключением живой вакцины).

Вакцинация проводится после информирования пациента (его законного представителя) об инфекции, против которой проводится прививка. Пациенту сообщается название вакцины, а также информация о наличии противопоказаний, закономерностей и особенностей течения поствакцинального периода.

Вакцинация проводится после получения согласия пациента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Получить прививку против COVID-19 в настоящее время можно в амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения по месту жительства после прохождения врачебного осмотра.



Автор: Бобрикович Н.А. Редактор: Бувина С.А.