

Внимание: сибирская язва!

Сибирская язва – инфекционное заболевание, споры возбудителя которого чрезвычайно устойчивы во внешней среде и могут сохраняться в почве десятилетиями.

Источниками инфекции являются различные виды животных: овцы, козы, коровы, быки, лошади, свиньи, дикие животные



Легочная

Кишечная

Кожная

Виды

Пути передачи

Контактный (при разделке туш, уходе за инфицированными животными и др.)

Алиментарный (при употреблении сырого или недоваренного мяса инфицированного животного)

Трансмиссивный (через укусы насекомых)

Воздушно-капельный (при вдыхании загрязненной костной муки и пыли)

Симптомы

Продолжительность инкубационного периода колеблется от нескольких часов до 8 дней, чаще всего составляет 2 – 3 дня.

1. При кожной форме сибирской язвы на месте, куда попала инфекция, сначала появляется зуд, возникает пятно, которое начинает пузыриться, через 2-6 дня превращается в язву, покрывающуюся черным струпом. При этом у больного повышается температура, болит голова, ломит тело.

2. При легочной форме сибирской язвы первые признаки похожи на грипп. Через 3-5 дней развивается острая легочная недостаточность, которая приводит к шоку и смерти.

3. Кишечная форма сибирской язвы характеризуется общей интоксикацией, повышением температуры тела, начинаются сильные боли в животе, рвота, жидкий стул с кровью.

Как не заболеть сибирской язвой?

- используйте в пищу только качественные и безопасные мясные продукты, не приобретайте мясо и другую продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли;
- соблюдайте технологию приготовления мясных и молочных блюд;
- соблюдайте правила личной гигиены, в том числе при уходе за животными

Если вы все-таки заболели, не надо заниматься самолечением – обратитесь к врачу!